



Importancia de la coordinación entre familia, escuela e instituciones para prevenir el consumo y apoyar la recuperación en proceso de drogadicción

Importance of coordination between family, school, and institutions to prevent drug use and support recovery from drug addiction

 <https://doi.org/10.47230/unesum-salud.v5.n1.2026.96-106>

Recibido: 01-08-2025 **Aceptado:** 27-09-2025 **Publicado:** 15-01-2026


Dolores Mirella Cedeño Holguín^{1*}

 <https://orcid.org/0000-0002-8572-0327>


Sonia Patricia Ubillus Saltos²

 <https://orcid.org/0000-0002-8666-1269>

Maikel Steven Loor Zambrano³

 <https://orcid.org/0009-0009-7172-4501>

Anthony Joan López Anchundia⁴

 <https://orcid.org/0009-0000-7261-7534>

1. Universidad Estatal del Sur de Manabí; Jipijapa, Ecuador.
2. Universidad Estatal del Sur de Manabí; Jipijapa, Ecuador.
3. Universidad Estatal del Sur de Manabí; Jipijapa, Ecuador.
4. Universidad Estatal del Sur de Manabí; Jipijapa, Ecuador.

Volumen: 5

Número: 1

Año: 2026

Paginación: 96-106

URL: <https://revistas.unesum.edu.ec/salud/index.php/revista/article/view/114>

***Correspondencia autor:** dolores.cedeno@unesum.edu.ec



RESUMEN

El uso y abuso de las drogas se encuentra asociado con la reducción de los niveles de desempeño físico-afectivo en edades tempranas, debido a las afectaciones directas que genera en el cerebro donde la necesidad de prevenir no solo desde una política para evitar el abuso del consumo de las drogas a nivel de país, sino en ayudar al estudiante a saber elegir y a decidir en un mundo donde la presencia de las drogas es algo natural con la puesta en práctica de estrategias efectivas. El objetivo general del estudio fue analizar la importancia de la coordinación entre familia, escuela e instituciones para prevenir el consumo y apoyar la recuperación en proceso de drogadicción, aplicando una metodología de estudio documental, tipo descriptivo y explicativo. Entre los resultados se encuentra que el consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes se puede evidenciar que la frecuencia es mayor en Perú con un 79%, seguida de Ecuador con una frecuencia que alcanza el 73.9% y Brasil con un 70%, las medidas de prevención contra la drogadicción deben ser integrales, sostenidas en el tiempo y adaptadas al contexto. Concluyendo así que el consumo de drogas en adolescentes y jóvenes no solo representa un problema de salud en sí mismo, sino que también está estrechamente relacionado con una serie de conductas de riesgo que pueden tener consecuencias graves e irreversibles.

Palabras clave: Adolescentes, Drogas, Marihuana, Prevención, Resiliencia.

ABSTRACT

Drug use and abuse is associated with reduced levels of physical and emotional performance at early ages, due to the direct effects it generates on the brain. This creates a need to prevent this not only through policy measures to avoid drug abuse at the national level, but also through helping students make informed choices and decisions in a world where the presence of drugs is natural, through the implementation of effective strategies. The overall objective of the study was to analyze the importance of coordination between families, schools, and institutions to prevent drug use and support recovery from drug addiction, applying a descriptive and explanatory documentary study methodology. The results show that the highest frequency of psychoactive substance use among adolescents is Peru, at 79%, followed by Ecuador, at 73.9%, and Brazil, at 70%. Drug prevention measures must be comprehensive, sustained over time, and adapted to the context. Thus, we conclude that drug use among adolescents and young adults not only represents a health problem in itself, but is also closely related to a series of risky behaviors that can have serious and irreversible consequences.

Keywords: Adolescents, Drugs, Marijuana, Prevention, Resilience.



Creative Commons Attribution 4.0
International (CC BY 4.0)

Introducción

El consumo excesivo de drogas, ya sean legales o ilegales, y sus efectos a nivel físico y emocional constituyen un problema para la salud pública en el mundo entero. La experiencia de ese consumo, en particular durante la adolescencia, puede ser un marco significativo en el paso de esa fase del desarrollo a la vida adulta. La búsqueda de identidad y la separación progresiva de los padres caracterizan esta etapa, en la que la familia es al mismo tiempo una fuente de apoyo y seguridad, así como aquella que tiene como propósito establecer límites (48).

El consumo excesivo de eso, que suele ser influenciado por los compañeros, conduce a la falta de control y a consecuencias perjudiciales para la vida de esos jóvenes, lo cual puede propiciar adicción. Por lo tanto, los costos generados por el mal uso de drogas son muy altos, no solo en el ámbito económico sino también a nivel personal, familiar y social. Esto obliga a los profesionales sanitarios a participar activamente en la prevención de agravios y en la promoción de la salud, en sus diversos niveles de atención (49).

El fenómeno del consumo de sustancias psicoactivas es intrincado y no puede explicarse a partir de causas individuales; más bien, se cree que proviene de la interacción de varios factores biológicos, sociales y psicológicos (familiares, escolares y grupales), que contribuyen a la formación de un patrón de abuso o dependencia (3).

La segunda encuesta nacional sobre el uso de drogas, llevada a cabo entre los alumnos de educación secundaria del Ecuador, reveló un aumento global en el consumo de estas sustancias. La primera vez que se consume tabaco es a los 13 años; la de marihuana, a los 13 años y dos meses; la de alcohol, a los 13 años y siete meses; y la de inhalables, a los 13 años y cuatro meses (4). Es posible observar que la marihuana y los inhalables tienen una gran importancia, ya que su uso se incrementó más del doble

entre 1998 y 2005. Además, se observó de forma consistente un incremento significativo en la edad media, pasando de 13 a 18 años. Se constató también que las drogas ilegales tienen frecuencias de consumo inferiores a las legales (inhalantes 1,62%, marihuana 4,32%, cocaína 1,05% y drogas vegetales 0,88%) (5).

En Ecuador, el uso de drogas es elevado; ocupa uno de los primeros lugares en América Latina, con una tasa del 51%, mayor a la de Perú, Chile y Uruguay. El fenómeno se presenta principalmente en los jóvenes, una de las poblaciones que más frecuenta esas sustancias tóxicas según el Informe de la CONSEP (2005), que reveló que el 60,7 % de la gente comenzó a consumir alcohol entre los 15 y 19 años. Los efectos de la drogodependencia son devastadores para la salud y la calidad de vida de las personas durante las etapas de juventud y adolescencia, ya que el cuerpo humano está atravesando un proceso de maduración (6).

Debido a las repercusiones del consumo de drogas, se llevan a cabo acciones dirigidas a educar a la población, como campañas en medios de comunicación, leyes para disminuir la disponibilidad de las drogas y políticas generales, tanto en el ámbito sanitario como en el educativo o comunitario (7). En muchos lugares, el principal obstáculo para actuar correctamente ha sido la falta de información detallada, confiable y abundante; sin embargo, esta tarea ha resultado difícil debido a la complejidad del fenómeno de las drogas y porque no siempre se dispone fácilmente de información (8).

La resiliencia es una de las actitudes más trabajadas en el sector sanitario para prevenir comportamientos como la drogodependencia. La resiliencia está relacionada con patrones relacionales, que incluyen el valor de una relación cercana y confiable, así como de una extensa red social; patrones situacionales, que comprenden habilidades cognitivas de valoración, habilidades para resolver problemas y atributos que indican

capacidad para actuar ante una situación; y patrones filosóficos, que suponen la creencia de que la vida tiene un propósito, cada persona tiene un camino único en la vida y es importante mantener una visión equilibrada del propio existir (9).

En las instituciones educativas, es común hallar temores e inseguridad para abordar esta problemática, pero principalmente la falta de programas formativos que ayuden a fomentar la salud en las escuelas. Esta opción de intervención que se ofrece desde la educación proporciona pautas a los profesores que afrontan este problema. Para ello, es necesario tratar este tema relevante en el cual se pueda ofrecer información sobre las medidas preventivas contra la drogadicción. Por lo tanto, es importante tener la posibilidad de sugerir un sistema de actividades extracurriculares en el futuro, orientadas a prevenir el consumo de drogas y promover actitudes resilientes entre los estudiantes. El desarrollo de la presente investigación se da como resultado del estudio denominado Cuidado comunitario de prevención y atención de conductas adictivas en adolescentes de las tres parroquias urbanas del cantón Jipijapa, año 2025.

Objetivo General

- Analizar la importancia de la coordinación entre familia, escuela e instituciones para prevenir el consumo y apoyar la recuperación en proceso de drogadicción.

Objetivos Específicos

- Identificar la frecuencia del consumo de drogas en adolescentes.
- Establecer las conductas de riesgo de los adolescentes por el consumo de drogas.
- Determinar medidas preventivas contra el consumo de drogas en adolescentes.

Metodología

Diseño y tipo de estudio

La presente investigación es un estudio de diseño documental, tipo descriptivo y explicativo.

Estrategia de búsqueda

Se realizó una revisión bibliográfica de artículos en idiomas español, inglés y portugués. Para la localización de la información se realizó una búsqueda bibliográfica en bases de datos como Scielo, Medigraphic, PubMed, Redalyc y paginas oficiales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) utilizando palabras clave: drogas, adolescentes, marihuana, prevención, resiliencia. Se emplearon los booleanos “and” “or” para la búsqueda de información.

Análisis de información

Los investigadores consignaron las características básicas de publicación (año, revista, país en el que se desarrolló el estudio y tipo de perspectiva de sistema de salud, conflicto de interés), las características de diseño de los estudios, los resultados y sus conclusiones. Los artículos originales y guías fueron analizados por los investigadores del estudio, quienes consignaron el número de artículos incluidos, metodología de la revisión, resultados finales y conclusiones.

Criterios de inclusión y exclusión

Criterios de inclusión

- Artículos originales
- Estudios en idiomas inglés, español o portugués
- Estudios que tengan libre acceso a la información relacionada con estrategias preventivas contra el consumo de drogas.
- Artículos con 5 años de publicación (2020 hasta enero del 2025).

Criterios de exclusión

- Artículos con información incompleta

- Opiniones, cartas al editor, tesis, reportes de casos únicos, revisiones sin metodología definida.
- Artículos que no correspondan al grupo etario (adultos, adultos mayores).
- Revistas de bajo impacto o no revisadas por pares.

Consideraciones éticas

Esta investigación respeta los derechos de autor realizando una correcta citación acorde a las Normas Vancouver.

Resultados

Tabla 1. Frecuencia del consumo de drogas en adolescentes

Autor/ Ref.	País	Año	n	Edad	Frecuencia		Tipo de droga
					Mujer	Hombres	
Cabanillas W (10)	Perú	2020	108	15 – 18 años	n=69/63.8%	n=39/36.1%	Cocaína n=72/23.6%
López A y col (11)	Colombia	2020	320	13 – 17 años	n=157/49%	n=163/50.9%	Marihuana n=178/56.1%
Páez A y col (12)	Brasil	2020	500	17 – 21 años	n=219/43.8%	n=281/56.2%	Marihuana n=179/13.5%
Leal E y col (13)	Perú	2021	35310	13 – 15 años	n=27912/79%	n=7398/20.9%	Heroína n=3195/17.3%
Rodríguez D y col (14)	Ecuador	2021	388	16 – 18 años	n=101/26%	n=287/73.9%	Marihuana n=201/35.1%
Neyra y col (61)	Perú	2022	43	15 – 21 años	n=13/30.2%	n=30/69.8%	Cocaína n=25/8.8% Benzos n=7/14.6% Cannabis n=179/21.8%
Bertone y col (16)	Argentina	2022	341	15 – 24 años	n=138/40.5%	n=203/59.5%	Heroína n=121/3.7% Marihuana n=172/22.4%
Rojas y col (17)	Argentina	2022	279	15 – 19 años	n=85/30.4%	n=194/69.5%	Ketamina n=56/7.2% Metanfetamin

Autor	País	Año	n	Edad	n (%)	n (%)	Substancias
Delfrade y col (18)	Venezuela	2022	922	15 – 18 años	n=461/50%	n=461/50%	Esteroides n=259/59.5% n=107/20%
Bohórquez y col (65)	Colombia	2023	124	15 – 19 años	n=63/50.8%	n=61/49.1%	Alucinógenos n=83/10.7%
Valdevila y col (20)	Ecuador	2023	721	15 – 20 años	n=345/47.8%	n=376/52.2%	Heroína n=418/30.5%

Análisis e interpretación:

En base al grupo de autores mencionados sobre el consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes se puede evidenciar que la frecuencia es mayor en Perú con un

79% (en edades de 13 a 15 años), seguida de Ecuador con una frecuencia que alcanza el 73.9% (edad promedio de 16 a 18 años) y Brasil con un 70% (adolescentes en edad de 13 a 19 años).

Tabla 2. Conductas de riesgo en adolescentes por el consumo de sustancias psicoactivas

Autor	País	Año	n	Tipo de estudio	Edad	Drogas	Conductas de riesgo
Valdez C y col (21)	Argentina	2020	341	Estudio retrospectivo	23 – 28 años	Cocaína	Delincuencia
Paez A y col (22)	Brasil	2020	284	Estudio retrospectivo	18 – 25 años	Marihuana Tabaco	Consumo por diversión
Moreira J y col (23)	Ecuador	2020	112	Estudio descriptivo transversal	25 - 29 años	Heroína	Consumo por diversión
Enríquez C y col (24)	Ecuador	2020	378	Estudio retrospectivo	15 – 20 años	Marihuana Tabaco	Mala relación Familiar
Rosales Y y col (25)	Cuba	2020	179	Estudio retrospectivo	15 – 23 años	Tabaco	Mala relación Familiar
Roldan Y y col (26)	Cuba	2021	66	Estudio descriptivo transversal	10 – 29 años	Benzenos	Búsqueda de nuevas sensaciones
Tintaya M y col (27)	Cuba	2021	553	Descriptivo, analítico y corte transversal	15 – 23 años	Cocaína Heroína	Conductas antisociales
Balbinot C y col (28)	Brasil	2022	257	Cohorte	12 – 25 años	Heroína	Delincuencia

col (28)				prospectiva	años		
Oliveira B y col (29)	Brasil	2022	416	Descriptivo y Prospectivo	18 – 25 años	Tabaco	Consumo por diversión
Hidalgo C (30)	Ecuador	2022	301	Estudio descriptivo transversal	18 – 26 años	Metafetaminas	Conductas antisociales

Análisis e interpretación:

Los adolescentes, debido a su etapa de desarrollo, son más susceptibles a involucrarse en conductas de riesgo asociadas al consumo de estas sustancias. Existen un sin número de conductas que influyen para que las personas caigan en el mundo de las drogas. En base a los autores mencionados anteriormente se evidencia que las

mujeres se ven influenciadas por conductas como la delincuencia, la diversión y la mala relación familiar. En cuanto a los hombres las conductas antisociales, la mala relación familiar, la violencia intrafamiliar y la delincuencia son las principales conductas de riesgos, sin embargo, también se encuentran otros factores como el consumo por diversión, la rebeldía, la presión social y la autoestima baja.

Tabla 3. Medidas de prevención contra el consumo de drogas en adolescentes

Autores	Año	País	n ⁰	Medida de prevención
Berrocal y col (31)	2020	Uruguay	341	Concienciación sobre los riesgos de las drogas
Orcasita y col (32)	2020	Colombia	284	Disponer de herramientas emocionales
Reyes y col (33)	2020	Ecuador	179	Convivir dentro de un buen ambiente
Gaviria y col (34)	2020	Colombia	112	Promover la comunicación asertiva
Vega y col (35)	2021	Perú	66	Tener hábitos de vida saludables
Cardozo y col (36)	2021	Brasil	378	Identificar señales de alarma
Álvarez y col (37)	2021	Colombia	346	Fortalecimiento de habilidades sociales y autoestima Campañas de

Bolívar y col (38)	2021	Brasil	301	concienciación en medios de comunicación
Tintaya y col (85)	2021	Perú	145	Convivir dentro de un buen ambiente
Pavón y col (40)	2022	México	294	Identificar señales de alarma

Análisis e interpretación

Las medidas de prevención contra la drogadicción deben ser integrales, sostenidas en el tiempo y adaptadas al contexto, la clave no está solo en informar, sino en formar ciudadanos con capacidad crítica, emocionalmente equilibrados y con oportunidades reales de desarrollo. La coordinación entre Estado, familia, escuela y comunidad es esencial para lograr resultados duraderos.

Discusión

El uso de drogas en la adolescencia es un problema que va en aumento y que repercute negativamente en el bienestar social, emocional y físico de los jóvenes. Basándose en investigaciones, el artículo analiza la relación entre el consumo de alcohol y drogas durante las fases esenciales de desarrollo de los adolescentes y una amplia gama de conductas riesgosas, que van desde logros académicos bajos hasta violencia, promiscuidad sexual, delincuencia y deterioro de la salud mental. Asimismo, se examinan las variables que propician la aparición de estas conductas, como la curiosidad, las presiones sociales y los problemas emocionales.

De acuerdo a Cango A y col (41), en sus estudios evidencian que la marihuana es una de las principales sustancias de mayor consumo por los adolescente, sin embargo autores como Rueda S y col (42), difieren con nuestros resultados al mostrar que la sustancia psicoactiva de mayor consumo es el alcohol, de la misma forma Frias F y col (43), mencionan que el alcohol y el taba-

co siguen siendo las sustancias de mayor preferencia por los adolescentes.

En cuanto a las conductas de riesgo en adolescentes por el consumo de sustancias psicoactivas se evidencio que en los hombres la mala relación familiar, la violencia intrafamiliar y la delincuencia son las principales conductas de riesgos, sin embargo, también se encuentran otros factores como el consumo por diversión, la rebeldía, la presión social y la autoestima baja. De acuerdo con Rojas T y col (44), concuerdan con que la mala relación familiar, la delincuencia y el consumo por diversión son las principales conductas que influyen en el consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes hombres, no obstante Scoppetta O y col (45), mencionan que los trastornos mentales, cognitivos y de la personalidad, tienen asociación con el consumo de drogas, también se ve ligado al nivel y el logro académico, así como a condiciones de desventaja socioeconómica.

El fácil acceso a sustancias adictivas, la presión de grupo, problemas familiares, estrés emocional y falta de habilidades para afrontar situaciones difíciles son factores que pueden contribuir al desarrollo de adicciones, hay donde radica la importancia de este tipo de estudios que puedan incentivar a futuro donde se sigan abarcando esta temática que son de interés, así como también dar a conocer ciertas medidas preventivas para disminuir el consumo de sustancias adictivas en adolescentes, que promuevan estilos de vida saludables en esta etapa crucial del desarrollo evolutivo.

Conclusiones

La frecuencia del consumo de drogas en adolescentes es un fenómeno preocupante que refleja múltiples factores de riesgo sociales, familiares y personales. Aunque varía según el contexto geográfico, socioeconómico y cultural, diversos estudios coinciden en que el inicio del consumo se produce cada vez a edades más tempranas, especialmente con sustancias como el alcohol, el tabaco y la marihuana. Esta tendencia evidencia la necesidad urgente de reforzar las estrategias de prevención desde una perspectiva integral, que no solo informe sobre los riesgos, sino que también promueva entornos protectores, fortalezca habilidades emocionales y ofrezca alternativas saludables de desarrollo personal.

El consumo de drogas en adolescentes y jóvenes no solo representa un problema de salud en sí mismo, sino que también está estrechamente relacionado con una serie de conductas de riesgo que pueden tener consecuencias graves e irreversibles. Entre ellas se destacan la violencia, las conductas sexuales sin protección, los accidentes, el abandono escolar y la exposición a actividades delictivas. Estas conductas no ocurren de manera aislada, sino que responden a un contexto de vulnerabilidad social, emocional y familiar. Por lo tanto, abordar el consumo de drogas implica también reconocer y atender los factores que lo rodean, como la falta de orientación, la presión social, los entornos inseguros y la carencia de proyectos de vida.

Las medidas preventivas frente al consumo de drogas son fundamentales para reducir el riesgo de que niños, adolescentes y jóvenes inicien o mantengan hábitos nocivos relacionados con sustancias psicoactivas. Estas estrategias deben ir más allá de la simple transmisión de información, enfocándose en el desarrollo de habilidades personales, el fortalecimiento del entorno familiar, la promoción de estilos de vida saludables y la creación de espacios seguros de participación y contención social.

Bibliografía

1. Mendoza Y, Vargas K. Factores psicosociales asociados al consumo y adicción a sustancias psicoactivas. *Revista Electrónica de Psicología Iztacala*. 2021; 20(1).
2. Carrasco A, Gutiérrez R, Cudris L et al. Consumo de sustancias psicoactivas, factores psicosociales y rendimiento académico en adolescentes colombianos. *Dialnet*. 2020; 39(3).
3. Pavón León P, Salas García B, Jorge Cárdenas X, Cruz Juárez A. Factores asociados al consumo de drogas en estudiantes de Artes. *Scielo*. 2022 Agosto; 14(28).
4. Celorio Y, Chavez R. TIPOLOGÍA DE CONSUMO DE DROGAS EN ADOLESCENTES Y SU INFLUENCIA EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO. *PSICOLOGÍA UNEMI*. 2024; 8(14): p. 90-103.
5. Riofrio R, Castanheira L. Consumo de drogas en los jóvenes de la ciudad de Guayaquil, Ecuador. *Revista Latino Americana de Enfermería*. 2020; 18.
6. Cango A, Suarez N. Consumo de droga en estudiantes ecuatorianos. Una alternativa de prevención y desarrollo resiliente del alumnado desde la escuela. *Revista de estudios y experiencias en educación*. 2021; 20(44): p. 364-383.
7. Rodrigues M, Timoteo D, De Araujo G y col. Factores asociados al consumo de drogas por adolescentes escolares. *Index de Enfermería*. 2022; 30(1-2): p. 24-28.
8. Castro S, Orosco D, Murillo A y col. Conductas adictivas en adolescentes: prevalencia, factores de riesgo y complicaciones. *MQRInvestigar*. 2023; 7(3): p. 3545-3560.
9. Jiménez Herrera Luis. Prevención contra las drogas. *Revista Costarricense de Salud Pública*. 2020; 19(2): p. 93-100.
10. Cabanillas Rojas William. Alcohol consumption and gender in the adolescent school population of Peru: evolution and intervention challenges. *Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública*. 2020; 37(1).
11. Lopez A, Porero C, Giraldo P. VIOLACIÓN DE ADOLESCENTES EN SITUACIÓN. *Medicina & Salud*. 2020;(41).
12. Páez A, Torres C, Ortiz S et al. Assédio escolar em adolescentes: papel, tipo de violência e determinantes. *Revista de escola de enfermagem*. 2020; 54.

13. Enriquez C, Lucero Y, Lozano M et al. Percepción de adolescentes sobre consumo de sustancias psicoactivas en entornos escolares. *MedUNAB*. 2021; 24(1).
14. Moreira J, Reyes N, Lopez P et al. Prevención de la drogadicción en niños, niñas y adolescentes de la comuna "Los Bajos del Pechiche. Polo del Conocimiento: Revista científico - profesional. 2021; 4(4).
15. Neyra R, Cano M, Taype L. Resiliencia e inteligencia emocional en pacientes diagnosticados con trastorno por consumo de sustancias. *Revista de NeuroPsiquiatria*. 2020; 83(4).
16. Berrocal N, Ocampo M, Herrera E. Determinantes sociales en el consumo de sustancias psicoactivas en estudiantes universitarios. *Enfermería Investiga*. 2022; 7(2).
17. Rojas E, Peranovich A,. Mortalidad por causas violentas en la población de 10 a 29 años de Argentina. *Revista Cubana de Salud Pública*. 2021; 45(3).
18. Delfredo J, Gomez J, Floristan Y et al. Diferencias por sexo y nivel de renta en la mortalidad por causas directamente relacionadas con el alcohol en Navarra. *Anales del Sistema Sanitario de Navarra*. 2020; 43(1).
19. Bohórquez D, Gomez D, Perez D et al. Desregulación emocional y nivel de riesgo por consumo de sustancias psicoactivas en universitarios. *CES Psicología*. 2022; 15(3).
20. Valdevila J, RulZ O, Orellana C. Conducta suicida y dualidad en trastornos por consumo de sustancias en drogodependientes ecuatorianos. *Revista Información Científica*. 2021; 100(5).
21. Valdez C, Cisneros M, Cortes G et al. Child to parent violence and drugs consumption in adolescents: a systematic review. *Revista Internacional De Investigación En Adicciones*. 2020; 6(1): p. 34-44.
22. Páez A, Torres C, Ortiz S et al. Acoso escolar en adolescentes: rol, tipo de violencia y determinantes. *Revista da Escola de Enfermagem*. 2020; 54.
23. Moreira J, Reyes N, Lopez P et al. Prevención de la drogadicción en niños, niñas y adolescentes de la comuna "Los Bajos del Pechiche. Polo del Conocimiento: Revista científico - profesional. 2020; 4(4): p. 51-70.
24. Ocampos M, Lozano L, Barreto Y et al. Percepción de adolescentes sobre consumo de sustancias psicoactivas en entornos escolares. *MedUNAB*. 2021; 24(1): p. 41-50.
25. Rosales Y, Góngora M, de la Rosa E et al. Calidad de vida de adolescentes y adultos jóvenes foráneos adictos atendidos en las comunidades terapéuticas El Cocal y El Quinqué. *Correo Científico Médico*. 2020; 23(1).
26. Roldan Y, Perez R, Falcon I et al. Patrones de consumo de drogas en adolescentes ingresados en el Hospital Pediátrico Provincial de Camagüey. *Humanidades Médicas*. 2021; 21(1): p. 109-123.
27. Tintaya M, Cuero R. Facteurs psychosociaux associés à la participation politique non conventionnelle dans un échantillon de jeunes citoyens à Lima, Pérou. *Revista de Psicología (PUCP)*. 2021; 39(2).
28. Balbinot C, Coscioni V, Rosa E et al. O CONVÍVIO ENTRE ADOLESCENTES EM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. *Psicologia em Estudo*. 2022;(27).
29. Oliveira B, Da Silva J, Mendoca L et al. ATITUDES DE ADOLESCENTES ESCOLARES SOBRE O CONSUMO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS: ESTUDO TRANSVERSAL. *Revista Baiana De Enfermagem*. 2022; 36.
30. Hidalgo Candell Cassandra. Factores de riesgo familiar en el consumo de drogas y su relación con la conducta antisocial en adolescentes. *Más Vida*. 2022; 2(3).
31. Berrocal N, Ocampo M, Herrera E. Determinantes sociales en el consumo de sustancias psicoactivas en estudiantes universitarios en 2016. *Enfermería: Cuidados Humanizados*. 2020; 7(2).
32. Orcasita L, Lara V, Suárez A y col. Factores psicosociales asociados a los patrones de consumo de alcohol en adolescentes escolarizados. *Psicología desde el Caribe*. 2020; 35(1).
33. Reyes L, Carmona F, Méndez S y col. Factores psicosociales asociados al consumo de sustancias psicoactivas en jóvenes universitarios entre los 16 y 24 años. *Ciencia, Tecnología, Innovación en Salud*. 2020; 4.
34. Gaviria S, Duque M, Vergel J y col. Perinatal Depressive Symptoms: Prevalence and Associated Psychosocial Factors. *Revista Colombiana de Psiquiatria*. 2020; 48(3).
35. Vega J, Alvarado T. Factores psicosociales que intervienen en el consumo de sustancias psicotrópicas en adolescentes. *Atención Familiar*. 2021; 26(2).

36. Cardozo A, Martínez M, De La Peña A y col. Factores psicossociais associados ao conflito infantil na escola. *Educação & Sociedade*. 2021; 40.
37. Álvarez A, Carmona N, Pérez A y col. Factores psicosociales asociados al consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes de Pereira, Colombia. *Universidad y Salud*. 2021; 22(3).
38. Bolívar P, Vargas M, Fonseca M y col. Factors associated with the consumption of psychoactive substances in a population attended in a hospital in Tunja: Case-control study. *Ciencia e Innovacion en Salud*. 2021 Enero.
39. Tintaya M, Cueto R. Facteurs psychosociaux associés à la participation politique non conventionnelle dans un échantillon de jeunes citoyens à Lima, Pérou. *Revista de Psicología (PUCP)*. 2021; 39(2).
40. Pavón P, Salas B, De San Jorge X y col. Factores asociados al consumo de drogas en estudiantes de Artes. *Nova scientia*. 2022; 14(28).
41. Cango A, Suárez N. Consumo de droga en estudiantes ecuatorianos. Una alternativa de prevención y desarrollo resiliente del alumnado desde la escuela. *Redalyc*. 2021; 20(44).
42. Rueda S, Velásquez J, Alvarán S. Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas y su relación con características sociodemográficas, familiares y de personalidad en estudiantes en formación tecnológica. *Scielo*. 2022; 39(1).
43. Frias F, Hinojosa L, García P, Jimenez A. Consumo de drogas lícitas e ilícitas en jóvenes de bachillerato. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*. 2022 Octubre; 6(6).
44. Rojas T, Reyes B, Tapia A, Sanchez J. El consumo de sustancias psicoactivas y su influencia en el desarrollo integral. *Redalyc*. 2020; 4(1).
45. Scoppetta O, Avendaño B, Cassiani C. Factores Individuales Asociados al Consumo de Sustancias Ilícitas: Una Revisión de Revisiones. *Scielo*. 2022 Mayo; 51(3).

Cómo citar: Cedeño Holguín, D. M. ., Ubillus Saltos , S. P., Loor Zambrano , M. S. ., & López Anchundia, A. J. . . (2026). Importancia de la coordinación entre familia, escuela e instituciones para prevenir el consumo y apoyar la recuperación en proceso de drogadicción. *Revista Investigación Y Educación En Salud*, 5(1), 96–106. <https://doi.org/10.47230/unsum-salud.v5.n1.2026.96-106>